Résultats de l’étude clinique

Promoteur de l’étude : Eisai

Médicament à l’étude : Lenvatinib ou E7080

Titre abrégé de l'étude : Étude destinée à déterminer si le lenvatinib aide les personnes atteintes d'un cancer du foie par rapport au sorafénib

Merci !

Vous avez participé à cette étude clinique portant sur le lenvatinib, également dénommé E7080. Vous-même, ainsi que tous les autres participants, aidez les chercheurs à recueillir des informations complémentaires sur le lenvatinib pour aider les personnes atteintes de cancer du foie.

Eisai, un laboratoire pharmaceutique japonais, promoteur de cette étude, vous remercie de votre aide. Le laboratoire Eisai s’est engagé à améliorer la santé par des recherches continues dans des domaines couvrant des besoins médicaux non satisfaits et à partager avec vous les résultats de l’étude à laquelle vous avez participé. Eisai a préparé ce résumé avec une organisation indépendante sans but lucratif, le CISCRP, et une société de rédaction médicale et réglementaire, Synchrogenix.

Si vous avez participé à l'étude et que vous avez des questions sur les résultats, n'hésitez pas à vous adresser au médecin ou à l'équipe de votre centre d'étude.

Que se passe-t-il maintenant avec cette étude ?

L'étude a débuté en mars 2013, et elle est toujours en cours. Le promoteur a examiné les données collectées jusqu'en novembre 2016 et a créé un compte rendu des résultats. Ce document est un résumé de ce compte rendu.

L'étude a inclus 954 participants dans 183 centres d'étude répartis dans 20 pays :

Allemagne	Fédération de Russie	Philippines
Belgique	France	Pologne
Canada	Hong Kong	Royaume-Uni
Chine	Israël	Singapour
Corée du Sud	Italie	Taïwan
Espagne	Japon	Thaïlande
États-Unis	Malaisie	

Pourquoi cette recherche est-elle nécessaire ?

Les chercheurs examinent un moyen différent de traiter les personnes présentant un type fréquent de cancer avancé du foie, dénommé carcinome hépatocellulaire, en abrégé CHC. Les traitements standard du CHC sont la chirurgie, mais également d'autres traitements destinés à faire régresser les tumeurs. Toutefois, ces traitements peuvent ne pas aider toutes les personnes ayant atteint des stades tardifs de CHC avancé.

Les chercheurs de cette étude ont souhaité recueillir des informations complémentaires sur un médicament, le lenvatinib. Ce médicament peut empêcher la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins qui sont nécessaires aux tumeurs pour se développer et se propager. Les chercheurs ont souhaité étudier les effets du lenvatinib en le comparant à un autre médicament, le sorafénib. Le sorafénib est déjà autorisé dans le traitement du CHC.

Les principales questions auxquelles les chercheurs souhaitaient répondre au cours de cette étude ont été les suivantes :

- Les participants ayant été traités par le lenvatinib ont-ils vécu aussi longtemps que les participants traités par le sorafénib ?
- Le lenvatinib a-t-il apporté un bénéfice équivalent à celui du sorafénib sous d'autres aspects ?
- Le lenvatinib a-t-il affecté la qualité de vie des participants davantage que le sorafénib ?
- Comment le lenvatinib agit-il dans l'organisme ?
- Quels événements indésirables ont présenté les participants traités par le lenvatinib ? Un événement indésirable est un problème médical qui peut ou non être provoqué par le médicament à l'étude.

De quel type d'étude s'agit-il ?

Pour répondre à toutes ces questions, les chercheurs ont demandé l'aide de femmes et d'hommes comme vous. Les participants de cette étude étaient âgés de 20 à 88 ans ; 84,5 % des participants étaient des hommes et 15,5 %, des femmes. Ils présentaient tous un CHC qui ne pouvait pas être retiré par chirurgie ou par d'autres traitements, et n'avaient pas été traités par chimiothérapie.

Il s'agit d'une étude « ouverte ». Cela signifie que les participants, les médecins et l'équipe de l'étude ainsi que le promoteur connaissent les médicaments que prennent les participants. Les participants ont pris soit le lenvatinib, soit le sorafénib au début de l'étude.

Un programme informatique a été utilisé pour déterminer de manière aléatoire le médicament que chaque participant devait prendre. Cela permet de s'assurer que les groupes sont choisis de manière impartiale. Les chercheurs utilisent cette procédure pour comparer les résultats de chaque traitement de manière aussi exacte que possible.

Vous avez pris les traitements à l'étude par voie orale (par la bouche). Le tableau ci-dessous montre comment les traitements ont été administrés au cours de votre étude.

476 participants ont pris le lenvatinib	475 participants ont pris le sorafénib
Au début de l'étude, chaque dose était égale à 8 ou 12 « mg », une unité également dénommée « milligramme », mais les doses pouvaient être abaissées si le médicament provoquait des problèmes médicaux La quantité de lenvatinib dans chaque dose a été basée sur le poids du participant	Chaque dose était égale à 400 mg
Vous avez pris les comprimés de lenvatinib une fois par jour	Vous avez pris les comprimés de sorafénib deux fois par jour

Que s'est-il passé au cours de l'étude ?

La figure ci-dessous montre de quelle manière s'est déroulée l'étude.

Comment s'est déroulée cette étude ?

Au cours de l'étude

Tous les participants ont continué à prendre les médicaments à l'étude jusqu'à l'un des événements suivants :

- leur cancer s'est aggravé
- ils ont présenté des événements indésirables insupportables
- ils ont quitté l'étude

La totalité des participants ont pris le traitement tous les jours, au cours de cycles de 28 jours.

Après la dernière dose

Tous les participants

- ont effectué une visite d'étude dans un délai de 30 jours
- ont fait l'objet d'un contrôle afin de vérifier s'ils étaient toujours en vie toutes les 12 semaines

Avant que l'étude ne commence, les médecins ont effectué un bilan de santé complet afin de s'assurer que chaque participant pouvait y participer.

Les médecins ont effectué les procédures suivantes :

- Prélèvement d'échantillons de sang et d'urine
- Réalisation d'imageries des tumeurs chez tous les participants afin de déterminer le stade d'avancement de leur cancer
- Contrôle de la fonction du cœur de chaque participant

Au cours de l'étude, il a été assigné de manière aléatoire aux participants le lenvatinib une fois par jour ou le sorafénib deux fois par jour au cours de cycles de 28 jours. Pour chaque participant traité par le lenvatinib, un participant recevait le sorafénib.

Au cours de l'étude, les médecins ont effectué les procédures suivantes :

- Ils ont continué à contrôler la santé des participants et à prélever des échantillons de sang et d'urine
- Ils ont demandé aux participants toutes les 4 semaines de décrire comment ils se sentaient et s'ils avaient présenté des événements indésirables
- Ils ont effectué des imageries des tumeurs des participants toutes les 8 semaines pour déterminer si le cancer s'améliorait ou s'aggravait

Chaque participant pouvait continuer à prendre le médicament à l'étude jusqu'à l'un des événements suivants :

- leur cancer s'aggravait
- ils présentaient un événement indésirable insupportable
- ils décidaient de quitter l'étude

Leur cancer était considéré comme présentant une aggravation si la taille de leur tumeur existante augmentait ou si de nouvelles tumeurs se développaient.

Après leur dernière dose, tous les participants

- ont effectué une visite d'étude dans un délai de 30 jours
- ont fait l'objet d'un contrôle par les médecins toutes les 12 semaines

Quels ont été les résultats de l'étude jusqu'à présent ?

Ce document est un résumé des principaux résultats de cette étude obtenus jusqu'en novembre 2016. Les résultats peuvent varier entre chaque patient individuel et ne sont pas présentés dans ce résumé. Toutefois, les résultats de chaque participant sont pris en compte dans le résumé des résultats.

Les chercheurs ont examiné les résultats de nombreuses études afin de choisir les traitements susceptibles d'être les plus efficaces et les mieux tolérés. D'autres études peuvent fournir des informations nouvelles ou des résultats différents. Vous devez toujours demander conseil à un médecin avant d'apporter des changements quelconques à votre traitement.

Les participants ayant été traités par le lenvatinib ont-ils vécu aussi longtemps que les participants traités par le sorafénib ?

Oui. Les participants traités par le lenvatinib ont vécu aussi longtemps que les participants ayant pris le sorafénib.

Les chercheurs ont examiné la durée médiane pendant laquelle les participants ont vécu au cours de l'étude. La durée médiane se situe entre les durées les plus brèves et les plus longues pendant lesquelles les participants ont vécu. Par rapport à la durée médiane, la moitié des participants ont vécu plus longtemps et la moitié des participants moins longtemps.

Les chercheurs sont parvenus aux conclusions suivantes :

Lenvatinib	Les participants traités par le lenvatinib ont vécu pendant une durée médiane d'environ 13,6 mois.
Sorafénib	Les participants traités par le sorafénib ont vécu pendant une durée médiane d'environ 12,3 mois.

Le tableau ci-dessous montre les durées médianes pendant lesquelles les participants ont vécu au cours de l'étude.



D'une manière générale, les chercheurs ont constaté que le lenvatinib n'était pas inférieur au sorafénib en ce qui concerne la durée pendant laquelle les participants ont vécu au cours de l'étude.

Le lenvatinib a-t-il apporté un bénéfice équivalent à celui du sorafénib sous d'autres aspects ?

Les chercheurs ont également comparé le lenvatinib et le sorafénib par rapport aux critères suivants :

- Pendant combien de temps les participants sont-ils restés vivants avant que leur cancer ne s'aggrave ou qu'ils ne décèdent ?
- Quelle durée s'est écoulée avant que le cancer des participants ne s'aggrave ?
- Nombre de participants dont les tumeurs ont régressé ou disparu

Pendant combien de temps les participants sont-ils restés vivants avant que leur cancer ne s'aggrave ou qu'ils ne décèdent ?

Chez certains participants de l'étude, le cancer ne s'est pas aggravé. Toutefois, les chercheurs ont observé qu'un nombre supérieur de participants traités par le lenvatinib sont restés vivants plus longtemps avant que leur cancer ne s'aggrave, par rapport aux participants ayant pris le sorafénib.

Les chercheurs sont parvenus aux conclusions suivantes :

- Les participants ayant pris le lenvatinib sont restés vivants pendant une durée médiane de 7,4 mois avant que leur cancer ne s'aggrave ou qu'ils ne décèdent de leur cancer.
- Les participants ayant pris le sorafénib sont restés vivants pendant une durée médiane de 3,7 mois avant que leur cancer ne s'aggrave ou qu'ils ne décèdent de leur cancer.

Quelle durée s'est écoulée avant que le cancer des participants ne s'aggrave ?

Les chercheurs ont mesuré le délai médian qui s'est écoulé avant que le cancer des participants ne s'aggrave. Le délai qui s'est écoulé avant que le cancer ne s'aggrave a été plus long chez les participants traités par le lenvatinib, par rapport à ceux ayant pris le sorafénib.

Les chercheurs sont parvenus aux conclusions suivantes :

- Il s'est écoulé une durée médiane de 8,9 mois avant que le cancer ne s'aggrave chez les participants ayant pris le lenvatinib.
- Il s'est écoulé une durée médiane de 3,7 mois avant que le cancer ne s'aggrave chez les participants ayant pris le sorafénib.

Nombre de participants dont les tumeurs ont régressé ou ont disparu

Les chercheurs ont également compté le nombre de participants chez lesquels la totalité de leur cancer a disparu, les tumeurs ont régressé ou aucune nouvelle tumeur n'est apparue. Ces résultats ont été observés chez un nombre plus important de participants traités par le lenvatinib, par rapport aux participants ayant pris le sorafénib.

Ces résultats ont été observés chez :

- 24,1 % des participants du groupe du lenvatinib. Ce pourcentage représente 115 des 478 participants.
- 9,2 % des participants du groupe du sorafénib. Ce pourcentage représente 44 des 476 participants.

Le lenvatinib a-t-il affecté la qualité de vie des participants autant que le sorafénib ?

D'une manière générale, les chercheurs sont parvenus aux conclusions suivantes :

- Les participants traités par le lenvatinib ont fait état d'une qualité de vie à peu près équivalente à celle des participants ayant pris le sorafénib.
- La santé des participants traités par le lenvatinib s'est aggravée plus lentement que celle des participants ayant pris le sorafénib, en particulier en ce qui concerne la diarrhée et les problèmes de nutrition.

Comment le lenvatinib agit-il dans l'organisme ?

Les chercheurs ont effectué des analyses du sang des participants afin de déterminer la quantité de médicament à l'étude qu'il contenait. Connaître cette quantité aide les chercheurs à mieux comprendre comment le médicament à l'étude agit dans l'organisme.

Ils ont abouti aux résultats suivants :

- La manière dont le lenvatinib agit dans l'organisme dépend du poids du participant. Le lenvatinib reste davantage dans le sang des participants dont le poids est plus faible.
- La quantité de lenvatinib dans le sang et le taux d'événements indésirables ont été approximativement équivalents entre les participants ayant pris la dose de 8 mg ou celle de 12 mg, confirmant l'intérêt d'administrer la dose de départ plus faible de 8 mg chez les participants dont le poids est plus faible.

Quels problèmes médicaux ont présenté les participants ?

Les problèmes médicaux se produisant au cours des études cliniques sont dénommés « événements indésirables ». Un événement indésirable est qualifié de « grave » s'il engage le pronostic vital, provoque des problèmes durables ou si le participant doit être hospitalisé.

Cette section est un résumé des événements indésirables qui sont survenus au cours de cette étude. Ces problèmes peuvent ou non avoir été provoqués par les médicaments à l'étude. Les sites Internet mentionnés à la fin de ce résumé peuvent fournir des informations complémentaires sur les problèmes médicaux qui sont survenus au cours de cette étude. De nombreuses recherches sont nécessaires pour déterminer si un médicament provoque un problème médical.

Combien de participants ont présenté des événements indésirables ?

La plupart des participants ont présenté des événements indésirables au cours de cette étude :

- Le nombre de participants ayant présenté des événements indésirables a été approximativement équivalent pour chacun des médicaments à l'étude.
- Le nombre de participants ayant présenté des événements indésirables graves a été approximativement équivalent pour chacun des médicaments à l'étude.
- Un nombre plus important de participants prenant le lenvatinib ont interrompu le médicament à l'étude à la suite d'événements indésirables, par rapport au nombre de participants du groupe du sorafénib.

Le tableau ci-dessous montre le nombre de participants ayant présenté des événements indésirables au cours de l'étude.

Événements indésirables survenus au cours de cette étude

	Lenvatinib 8 mg (sur 151 participants)	Lenvatinib 12 mg (sur 325 participants)	Sorafénib (sur 475 participants)
Combien de participants ont présenté des événements indésirables ?	100,0 % (151)	98,2 % (319)	99,4 % (472)
Combien de participants ont présenté des événements indésirables graves ?	38,4 % (58)	45,2 % (147)	30,3 % (144)
Combien de participants ont interrompu le médicament à l'étude en raison d'événements indésirables ?	21,9 % (33)	18,8 % (61)	14,5 % (69)

Quels ont été les événements indésirables graves les plus fréquents ?

Dans les groupes du lenvatinib, 43,1 % des participants ont présenté des événements indésirables graves. Ce pourcentage représente 205 des 476 participants. Dans le groupe du sorafénib, 30,3 % des participants ont présenté des événements indésirables graves. Ce pourcentage représente 144 des 475 participants.

Les événements indésirables graves ci-dessous sont survenus chez au moins 3 % des participants. D'autres événements indésirables graves sont survenus, mais chez un nombre moins important de participants.

Événements indésirables graves survenus au cours de cette étude

	Lenvatinib 8 mg (sur 151 participants)	Lenvatinib 12 mg (sur 325 participants)	Sorafénib (sur 475 participants)
Diminution de l'appétit	3,3 % (5)	1,8 % (6)	0,4 % (2)
Insuffisance hépatique	3,3 % (5)	2,8 % (9)	1,7 % (8)
Perte de fonction cérébrale due à des lésions hépatiques	2,6 % (4)	5,2 % (17)	0,6 % (3)
Présence de liquide dans l'abdomen	0,7 % (1)	3,4 % (11)	2,3 % (11)

Au cours de cette étude :

- 12,8 % des participants ayant pris le lenvatinib sont décédés au cours de l'étude à la suite d'un événement indésirable grave. Ce pourcentage représente 61 des 476 participants.
- 7,6 % des participants ayant pris le sorafénib sont décédés au cours de l'étude à la suite d'un événement indésirable grave. Ce pourcentage représente 36 des 475 participants.

La plupart des décès ont été dus à une aggravation du cancer des participants.

Quels ont été les événements indésirables les plus fréquents ?

Les événements indésirables non graves survenus le plus fréquemment au cours de cette étude ont été la diarrhée et l'hypertension artérielle. Les événements indésirables ci-dessous sont survenus chez au moins 20 % des participants. D'autres événements indésirables sont survenus, mais chez un nombre moins important de participants.

Événements indésirables les plus fréquents survenus au cours de cette étude

	Lenvatinib 8 mg (sur 151 participants)	Lenvatinib 12 mg (sur 325 participants)	Sorafénib (sur 475 participants)
Hypertension artérielle	43,0 % (65)	41,8 % (136)	30,3 % (144)
Diarrhée	35,1 % (53)	40,3 % (131)	46,3 % (220)
Diminution de l'appétit	33,1 % (50)	34,5 % (112)	26,7 % (127)
Perte de poids	28,5 % (43)	32,0 % (104)	22,3 % (106)
Fatigue	27,8 % (42)	30,5 % (99)	25,1 % (119)
Présence de protéines dans l'urine	24,5 % (37)	24,6 % (80)	11,4 % (54)
Syndrome main-pied (rougeur et gonflement de la paume des mains et de la plante des pieds)	23,2 % (35)	28,6 % (93)	52,4 % (249)
Enrouement	18,5 % (28)	26,2 % (85)	12,0 % (57)
Nausées	15,9 % (24)	21,2 % (69)	14,3 % (68)

Combien de participants ont présenté des effets indésirables ?

Les effets indésirables sont des problèmes médicaux qui pourraient être dus au médicament à l'étude d'après le médecin de l'étude. Un effet indésirable est considéré comme « grave » s'il engage le pronostic vital, provoque des problèmes durables ou nécessite l'hospitalisation des participants.

La plupart des participants ont présenté des effets indésirables au cours de cette étude :

- Le nombre de participants ayant présenté des effets indésirables a été approximativement équivalent pour chacun des médicaments.
- Un nombre plus important de participants prenant le lenvatinib a présenté des effets indésirables graves, par rapport aux participants du groupe du sorafénib.
- Un nombre plus important de participants prenant le lenvatinib ont interrompu le médicament à l'étude à la suite d'effets indésirables, par rapport aux participants du groupe du sorafénib.

Le tableau ci-dessous montre le nombre de participants ayant présenté des effets indésirables au cours de l'étude.

Effets indésirables survenus au cours de cette étude

	Lenvatinib 8 mg (sur 151 participants)	Lenvatinib 12 mg (sur 325 participants)	Sorafénib (sur 475 participants)
Combien de participants ont présenté des effets indésirables ?	94,7 % (143)	93,5 % (304)	95,2 % (452)
Combien de participants ont présenté des effets indésirables graves ?	13,2 % (20)	19,7 % (64)	10,1 % (48)
Combien de participants ont interrompu le médicament à l'étude à cause d'effets indésirables ?	10,6 % (16)	8,0 % (26)	7,2 % (34)

Quels ont été les effets indésirables graves les plus fréquents ?

Dans les groupes du lenvatinib, 17,6 % des participants ont présenté des effets indésirables graves. Ce pourcentage représente 84 des 476 participants. Dans le groupe du sorafénib, 10,1 % des participants ont présenté des effets indésirables graves. Ce pourcentage représente 48 des 475 participants.

La diarrhée a été l'effet indésirable grave le plus fréquent survenu au cours de cette étude. Les effets indésirables graves ci-dessous sont survenus chez au moins 1 % des participants. D'autres effets indésirables graves sont survenus, mais chez un nombre moins important de participants.

Effets indésirables graves survenus au cours de cette étude

	Lenvatinib (sur 151 participants)	Sorafénib (sur 475 participants)
Diarrhée	1,5 % (7)	0,4 % (2)
Présence de liquide dans l'abdomen	1,3 % (6)	0,6 % (3)
Insuffisance hépatique	1,1 % (5)	0,6 % (3)

Au cours de cette étude :

- 2,3 % des participants ayant pris le lenvatinib sont décédés au cours de l'étude à la suite d'un effet indésirable grave. Ce pourcentage représente 11 des 476 participants.
- 0,8 % des participants ayant pris le sorafénib sont décédés au cours de l'étude à la suite d'un effet indésirable grave. Ce pourcentage représente 4 des 475 participants.

Quels ont été les effets indésirables les plus fréquents ?

L'hypertension artérielle et la diarrhée ont été les effets indésirables survenus le plus fréquemment au cours de cette étude. Les effets indésirables ci-dessous sont survenus chez au moins 20 % des participants. D'autres effets indésirables sont survenus, mais chez un nombre moins important de participants.

Effets indésirables les plus fréquents survenus au cours de cette étude

	Lenvatinib 8 mg (sur 151 participants)	Lenvatinib 12 mg (sur 325 participants)	Sorafénib (sur 475 participants)
Hypertension artérielle	40,4 % (61)	40,0 % (130)	27,6 % (131)
Diarrhée	22,5 % (34)	33,5 % (109)	41,5 % (197)
Syndrome main-pied (rougeur et gonflement de la paume des mains et de la plante des pieds)	22,5 % (34)	28,3 % (92)	52,4 % (249)
Diminution de l'appétit	25,8 % (39)	25,5 % (83)	21,1 % (100)
Présence de protéines dans l'urine	23,8 % (36)	24,0 % (78)	9,3 % (44)
Fatigue	21,9 % (33)	24,0 % (78)	20,8 % (99)
Enrouement	18,5 % (28)	23,4 % (76)	10,9 % (52)

De quelle manière cette étude a-t-elle aidé les patients et les chercheurs ?

Au cours de cette étude, les chercheurs ont recueilli des informations complémentaires sur la manière dont le lenvatinib avait aidé les personnes atteintes de cancer du foie, par rapport au sorafénib.

Les chercheurs ont examiné les résultats de nombreuses études afin de choisir les traitements susceptibles d'être les plus efficaces et les mieux tolérés. Ce résumé ne présente que les principaux résultats de cette étude unique. D'autres études peuvent fournir des informations nouvelles ou des résultats différents.

Des études cliniques sur le lenvatinib sont en cours, et d'autres études cliniques sont d'ores et déjà programmées.

Où puis-je obtenir des informations complémentaires à propos de l'étude ?

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur cette étude sur les sites Internet indiqués ci-dessous. Si un compte rendu complet des résultats de l'étude est disponible, il peut également être trouvé à l'adresse suivante :

- www.clinicaltrialsregister.eu - Lorsque vous serez sur le site Internet, cliquez sur **"Home and Search" « Accueil et Recherche »**, puis saisissez **2012-002992-33** dans le champ de recherche et cliquez sur **"Search" « Recherche »**.
- www.clinicaltrials.gov - Lorsque vous serez sur le site Internet, saisissez **NCT01761266** dans le champ de recherche puis cliquez sur **"Search" « Recherche »**.

Titre complet de l'étude : A Multicenter, Randomized, Open-Label, Phase 3 Trial to Compare the Efficacy and Safety of Lenvatinib (E7080) Versus Sorafenib in First-Line Treatment of Subjects With Unresectable Hepatocellular Carcinoma (Étude ouverte multicentrique, randomisée, de phase 3 comparant l'efficacité et la sécurité d'emploi du lenvatinib (E7080) vs sorafénib comme traitement de première intention chez des sujets présentant un carcinome hépatocellulaire non résécable)

Nº de protocole : E7080-G000-304

Le siège social d'Eisai, le promoteur de cette étude, est situé à Tokyo, Japon, et les sièges sociaux régionaux se trouvent à Woodcliff Lake, New Jersey, États-Unis, et à Hatfield, Hertfordshire, Royaume-Uni. Le numéro de téléphone pour recevoir des informations générales est le 44-845-676-1400.

Nous vous remercions

Eisai souhaiterait vous remercier pour le temps que vous avez consacré à cette étude clinique et l'intérêt que vous avez montré en y participant. Votre participation a permis d'apporter une contribution essentielle à la recherche et à l'amélioration des soins de santé.

Eisai Co., Ltd. est un laboratoire pharmaceutique mondial basé sur la recherche et développement, dont le siège social est situé au Japon. La mission de notre entreprise est « d'accorder la plus haute importance aux patients et à leurs familles et d'augmenter les bénéfices que les soins de santé peuvent apporter », ce que nous résumons comme notre philosophie des soins de santé humaine. Avec plus de 10 000 collaborateurs travaillant dans notre réseau mondial d'établissements de recherche et développement, de sites de fabrication et de filiales marketing, nous nous efforçons de mettre en pratique notre philosophie des soins de santé humaine en délivrant des produits innovants dans de multiples domaines thérapeutiques présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits, notamment l'oncologie et la neurologie. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter le site http://www.eisai.com.

Le Centre d'information et d'étude sur la participation à la recherche clinique (Center for Information & Study/Trial on Clinical Research Participation, CISCRP) est une organisation à but non lucratif se consacrant à l'éducation et à l'information du public sur la participation à la recherche clinique. Le CISCRP ne participe ni au recrutement des participants aux études cliniques, ni au déroulement de celles-ci.

CISCRP
One Liberty Square, Suite 510 • Boston, Massachusetts 02109 USA

1-877-MED-HERO • www.ciscrp.org

Synchrogenix est une organisation mondiale de rédaction médicale et réglementaire, qui ne participe ni recrutement des participants ni au déroulement des études cliniques.

Synchrogenix Headquarters
2 Righter Parkway, Suite 205 • Wilmington, Delaware 19803 USA

1-302-892-4800 • www.synchrogenix.com